

Clemastinfumarat

von <[E. Weisshaar](#)>

Handelsnamen: Tavegil® Sirup, Tavegil® Tabletten, Tavegil® Injektionslösung. Tavegil® Gel.

Hersteller: Novartis Consumer Health, München.

Packungsgrößen: Tabletten: 20 Tabletten (N1), 50 Tabletten (N2). Sirup: 125ml (N2). Injektionslösung: 5 Amp. (N1). Gel: 20g (N1), 50g (N2).

Indikation: Allergien, Pruritus. Parenterale Anwendung: Akute Allergien, Adjuvans bei anaphylaktischem Schock und Quincke-Ödem, Prophylaxe von Kontrastmittelallergien und histaminbedingten Komplikationen in der Anästhesie in Kombination mit einem H₂-Antihistaminikum sowie zur Prophylaxe von allergischen Nebenwirkungen in der Magenfunktionsdiagnostik.

Gel: Juckende und allergische Hauterkrankungen, Sonnenbrand, Insektenstiche.

Kontraindikationen: Engwinkelglaukom, Blasenentleerungsstörungen mit Restharnbildung, Porphyrie.

Gel: Anwendung bei großflächigen, insbesondere entzündlichen Hauterkrankungen (z.B. Verbürhungen, Verbrennungen), vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern.

Nebenwirkungen: Zentralnervöse Beschwerden wie Sedierung, Kopfschmerzen, Schwindel, Agitiertheit, Müdigkeit. Sehstörungen, Krampfanfälle, Glaukomauslösung (Engwinkelglaukom). Blutbildveränderungen z.B. Thrombozytopenie (sehr selten), vereinzelt Palpitationen, Synkopen. Mundtrockenheit, gastrointestinale Störungen, Miktonsstörungen. Überempfindlichkeitsreaktionen z.B. Exantheme. Einzelfälle: Leberfunktionsstörungen (Hepatitis, Transaminasenanstieg).

Gel: Vereinzelt lokale Überempfindlichkeitsreaktionen.

Wechselwirkungen: Die Wirksamkeit von zentraldämpfenden Pharmaka und Alkohol kann bei gleichzeitiger Einnahme von Antihistaminika verstärkt werden. Gel: dies soll nicht mit der Bindehaut des Auges in Berührung kommen und nicht auf offene Wunden gebracht werden.

Dosierung: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: morgens und abends 1 Tablette oder 20ml (ca. 1,5 Eßl.) täglich. Es können täglich bis zu 6 Tbl. oder 120ml Sirup verabreicht werden. Kinder von 1-3 Jahren: 2mal täglich 1-2 Teelöffel Sirup. Kinder von 4-6 Jahren: 2xtäglich ½ Tablette täglich oder 2 Teelöffel Sirup. Kinder 7-12 Jahren: 2mal täglich ½-1 Tablette oder 1 Eßl. Sirup. Parenterale Anwendung: 2mal täglich 1 Ampulle.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: [DNO](#)